



## REALIZAÇÃO:



RESPIRE

EDELEI.ORG   /CCDELEI  
/PROJETORESPIRE

**Atenção!** O LSD-25 e a maioria de seus análogos são substâncias psicotrópicas (drogas) ilícitas no Brasil. Seu uso, porte ou comércio estão sujeitos às penas de acordo com a lei vigente. Informe-se sobre a lei 11.343 de 2006. Saiba, esta lei é imprecisa e não estabelece uma quantidade que diferencie uso de tráfico!

### EVITE DIRIGIR

O uso de substâncias psicoativas altera sua percepção e pode te colocar em risco



### CUIDE DE VOCÊ E DE QUEM FAZ SEXO COM VOCÊ!

O uso de camisinha previne gravidez e a transmissão de IST/HIV/Aids e Hepatites Virais. Existem testes rápidos disponíveis na rede pública. Fazer o teste também é uma forma de prevenção!

## DIREITO DE SABER O QUE ESTÁ USANDO

Existem testes com reagentes químicos para detectar LSD e diferenciar de análogos. Esses testes já estão disponíveis no Brasil e diversos coletivos realizam essa análise de substâncias. Se preferir, você pode adquirir seu próprio kit de reagentes. Mas atenção: esses testes não avaliam pureza ou dosagem da substância, mas conseguem afirmar, por exemplo, se a substância esperada não está presente. Se decidir usar, teste sua substância!

**ATENÇÃO!** Não existe dose segura. Cada pessoa reage de uma forma sob efeito de substâncias.

**Observe** seu estado de humor, o ambiente e se está com pessoas em que confie antes de usar qualquer substância psicoativa.

**Perceba-se!** A ingestão de pequenas doses da substância é suficiente para conhecer os efeitos dela no seu corpo.

**Respire!** Uma pausa entre um uso e outro é sempre bom!

**Alimente-se!**  
**Hidrate-se!**

## CUIDADOS E CONTRAINDICAÇÕES

O uso de psicodélicos é contraindicado a pessoas com histórico pessoal e familiar de transtornos psiquiátricos com sintomas psicóticos.

# LSD - DOCE

ÁCIDO - PAPEL - GOTA - MICROPONTO

O LSD-25 é uma substância psicodélica da família das lisergamidas. Outras substâncias psicodélicas da família das feniletilaminas, como os Dox (DOB, DOI e DOC) e os NBOMe (25B, 25C e 25I-NBOMe), são consideradas análogas do LSD-25 e muitas vezes vendidas como se fossem LSD-25, pois os efeitos são semelhantes, embora as feniletilaminas possuam risco muito maior de intoxicação quando comparado ao LSD-25.

A intensidade e os efeitos mudam para cada substância. A duração pode ser de 6 a 11 horas no uso do LSD-25, com pouca variação para NBOMe's. No uso de DOB pode ser de 18 a 30 horas.

## ATENÇÃO!

**DOSES BEM PEQUENAS PODEM PROVOCAR EFEITOS INTENSOS E DURADOUROS! EMBORA O LSD-25 POSSUA MENOR TOXICIDADE E MENOR RISCO DE DANO FÍSICO, QUANDO COMPARADO ÀS FENILETILAMINAS, AMBOS PODEM DESENCADEAR EPISÓDIO PSICÓTICO E CONSEQUENTES RISCOS ASSOCIADOS.**

## EFEITOS

- Os efeitos dependem MUITO da dose consumida, do estado físico e psíquico no momento do uso (sono, alimentação, humor, expectativas, preocupações) e do contexto de uso (local, companhias, significados culturais), o chamado set e setting.
- Alterações na percepção do tempo e espaço, distorções visuais de cores e/ou formas, sinestesia (ou mistura dos sentidos, por exemplo: estímulos visuais evocando impressões sonoras), sentimentos de euforia, sentimentos de conexão com outras pessoas ou com o universo, pupilas dilatadas, alucinações; delírios.
- Efeitos negativos podem incluir sensações de náuseas, vômitos, tontura, taquicardia, confusão mental, pensamentos paranoicos, sentimentos intensos de medo e/ou ansiedade, entre outros.

RESPIRE E CUIDE-SE

## DICAS DE REDUÇÃO DE DANOS

- O LSD-25, assim como alguns análogos da família das lisergamidas (AL-LAD, ETH-LAD, 1P-LSD), não tem gosto (embora possa haver algum gosto dependendo do material e tinta do blotter, mas este passa rapidamente). Já os análogos da família das feniletilaminas têm sabor amargo e metálico que perduram por um tempo e podem provocar dormência na região por até uma hora;
- Os NBOMe's só são absorvidos se ficam na boca de 10 a 20 minutos. Se for ingerido direto, não é absorvido. Já o LSD-25 pode ser absorvido tanto na boca quanto no estômago;
- A proibição é um problema, pois nunca se tem certeza do que se está ingerindo. Então, se for usar, tome uma dose menor/fracione. Se for gota dilua em água, se for papel divida em pedaços;
- Use óculos escuros! Com as pupilas dilatadas, os olhos ficam mais expostos a lesões provocadas por exposição à luz e aos raios solares;

## CUIDADO COM A MISTURA

LSD / NBOMe + ÁLCOOL: pode confundir os efeitos e tornar a experiência mais imprevisível.

LSD / NBOMe + ESTIMULANTES: pode potencializar os efeitos estimulantes do LSD e análogos, trazendo riscos de problemas cardíacos e aumento de pressão arterial.

LSD / NBOMe + PSICODÉLICOS: pode resultar em experiências muito fortes e intensas. Redobre os cuidados: contextos seguros e atenção às doses!